NOTE XVI.

IXODIDÉ NOUVEAU DE L'AUSTRALIE

PAR

L. G. NEUMANN.

Amblyomma albolimbatum, n. sp.

Mâle. — Corps en ovale court, long 5^{mm}15 (rostre compris), plus large (3^{mm}25) vers le tiers postérieur, deux fois aussi large en arrière qu'en avant. *Ecusson* convexe, brillant, brun marron foncé (après séjour dans l'alcool), avec une tache jaunâtre sale dans chacun des angles scapulaires, et une étroite bordure blanchâtre depuis l'œil jusqu'à la limite du feston extrême. Sillon latéral formé par des ponctuations grandes et profondes, espacées en avant, contiguës en arrière de manière à y former, en avant du feston extrême, un sillon continu égal à la largeur de deux festons; des ponctuations semblables éparses, en dehors des précédentes et sur les festons; d'autres peu nombreuses, disposées en lignes irrégulières dans la moitié postérieure de l'écusson; quelques-unes, inégales, sur les angles scapulaires et sur le bord cervical; des ponctuations très fines, presque obsolètes, sur toute la surface. Pas de sillon marginal en avant des festons. Festons bien marqués, plus longs que larges, avec une ou deux très grandes ponctuations vers leur bord interne. Yeux grands, plats, blanchâtres. *Face ventrale* jaune verdâtre sale; des poils très courts, rares; festons bien apparents, chitineux, plus larges que longs. Péritrèmes en virgule allongée, à fond laiteux. — *Rostre* long (1^{mm}1), étroit. Base rectangulaire, plus large que longue, le bord postérieur concave (les angles postérieurs larges et à peine saillants). Hypostome long, spatulé, à huit files de dents. Palpes plats, garnis de quelques poils longs, blanchâtres; le 2e article une fois et demi aussi long que le 3e. — *Pattes* fortes, longues, brun rougeâtre. Hanches I à deux épines aiguës, écartées, l'externe plus longue, deux fois aussi longue que large; une épine semblable aux hanches II & III; une épine aussi longue que l'article aux hanches IV. Tarses étroits, terminés en talus, avec un petit éperon au sommet.



Ambl. albolimbatum ♂ - Hanches.

Femelle. — Inconnue.

D'après 2 ♂ recueillis sur un *Trachysaurus rugosus* Gray, d'Australie, du Jardin Zoologique de Rotterdam (Coll. du Musée d'hist. nat. à Leide et la mienne).

Amblyomma albolimbatum prend place parmi les *Amblyomma* de l'Asie et de l'Océanie selon les indications du tableau suivant, qui servira aussi pour *A. scaevola*, nouvelle espèce décrite par Oudemans:

1 Ecusson dorsal pourvu d'un sillon latéral contournant le bord postérieur.
  Ecusson dorsal à sillon latéral incomplet ou nul. — 2

2 Ecusson dorsal à sillon latéral continu.
  Ecusson dorsal à sillon latéral nul ou formé de ponctuations. — 3

3 Ecusson dorsal à sillon latéral formé de ponctuations. — 4
  Ecusson dorsal sans sillon latéral. — 6

4 Ecusson dorsal concolore, marron . *A. sublaeve.*
  Ecusson dorsal foncé avec taches claires. — 5

  Ecusson dorsal à bande marginale large, interrompue. Festons à ponctuations très fines . . . . *A. limbatum.*
  Ecusson dorsal à bande marginale étroite, ininterrompue. Festons à ponctuations très grandes . . . . *A. albolimbatum.*

6 Hanches I à 2 épines inégales, l'externe plus longue. — 7
Hanches I à 2 épines égales, courtes.

7 Ecusson dorsal à ponctuations réparties sur toute sa surface. — 8
Ecusson dorsal à ponctuations manquant par places. Tarses terminés en talus . . . . *A. cyprium.*

8 Tarses échancrés en escalier. Hypostome à 8 files de dents . . . . *A. testudinarium.*
Tarses terminés en talus. — 9

9 Hanches I à épines faibles. Hypostome à 6 files de dents. . . . . . . *A. decoratum.*
Hanches I à épine externe forte, l'interne très courte. Hypostome à 8 files de dents *A. scaevola.*

Toulouse, Novembre 1906.